

Abdeldjellil BEZZAOUCHA

MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE

PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE

VOLUME 3:

Maladies nécessitant une surveillance particulière

Office des Publications Universitaires

MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE

-PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE-

Table des matières	Page
- Infections à streptocoque bêta hémolytique du groupe A -----	1
- Trachome -----	23
- Infections respiratoires aiguës -----	36
- Hydatidose -----	47
- Bilharzioses -----	60
- Helminthiases -----	77
1. Généralités -----	77
2. Oxyurose -----	78
3. Ascariidase -----	83
4. Trichocéphalose -----	87
5. Téniasse à Hymenolepis nana -----	90
6. Téniasse à ténia saginata (ténia du boeuf) -----	92
7. Téniasse à ténia solium (ténia du porc) -----	95
8. Téniasse due au bothriocéphale -----	97
9. Trichinose -----	99

10. Distomatose hépatique	102
11. Ankylostomose (ou ankylostomiase)	105
12. Anguillulose	110
13. Prophylaxie	114
- Peste	124
- Arboviroses	143
1. Introduction	143
2. Caractères communs	144
3. Fièvre jaune	158
4. Virose à West-Nile	167
5. Virose à Sindbis	168
6. Fièvre à phlébotomes ou fièvre des trois jours	168
7. Fièvre de la Vallée du Rift	169
8. Dengue	170
Annexe 1. Maladies à virus Ebola et Marburg	174
Annexe 2. Fièvre de Lassa	175
- Rickettsioses	177
1. Typhus exanthématique	177
2. Typhus murin	185
3. Fièvre boutonneuse méditerranéenne	190
4. Fièvre Q	199
- Leptospirose	205
- Borreliose	214
1. Généralités	214

2. Fièvre récurrente cosmopolite	214
3. Fièvre récurrente régionale	220
4. Maladie de Lyme	224
- Charbon	226
- Lèpre	235

Le streptocoque (S) est un bacille à Gram positif, tétrade, en chaînettes d'égale longueur, en rayonnant d'inférieurs divers et se greffe très variablement, rigide, cryopile, inférieurs absents de la peau et des tumeurs locales, instabilité immunologique. Il est également responsable de deux pathologies aux symptômes géométriquement rigide et parfois disséminés.

1.1 Angine streptococcique

Tous les Groupes streptocoques, la période d'incubation de l'angine streptococcique est de 1 à 4 jours. Le diagnostic est souvent basé l'existence une fièvre dépassant 38°C, à début brutal, une douleur pharyngée spontanée aggravée par la déglutition, une érythème pharyngé et des adénopathies cervicales supérieures douloureuses et l'absence de coryza et de tosse.

Les Groupes streptocoques peut commencer l'angine peut être au caractère plus fortes une pharyngite avec tumeur et toux, chez le jeune enfant, il est plus probable pour une douleur et des signes dignes (souvent absentes, exceptionnellement) peuvent tromper.

Les Groupes streptocoques ont tenté d'apprécier le processus avec laquelle un clinicien parvient différencier une angine streptococcique d'une angine non streptococcique sur des critères cliniques. Les indices de validité des outils proposés restent cependant modestes. Ainsi, le diagnostic clinique de l'angine streptococcique est difficile.